




سرکلاژ

به زبان ساده بدانیم

بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم (ع) نیشابور



نیشابور خیابان امام خمینی امام خمینی ۱۲
۰۵۱-۴۲۲۲۱۵۱۱-۱۴
www.ghamarhospital.ir



تاریخ بازنگری: خرداد ۱۴۰۰



پس از سرکلاژ و رسیدن ماه آخر بارداری

قبل از شروع دردهای زایمان باید بخیه‌های دهانه رحم برداشته شود تا زایمان طبیعی امکان‌پذیر باشد.

در صورت بروز دردهای زودهنگام و زایمان زودرس باید بخیه سرکلاژ باز شود. بنابراین باید در این موقع فرد در بیمارستان تحت مراقبت قرار گرفته تا به موقع در خصوص بازکردن بخیه سرکلاژ اقدام شود.

عمل سرکلاژ دلیلی برای انجام سزارین نمی‌باشد.

پرهیز از نزدیکی

بعد از سرکلاژ در بعضی مواقع کمی خونریزی و لکه‌بینی ایجاد می‌شود که ممکن است طی یک الی دو روز ادامه داشته باشد و سپس قطع می‌گردد. فرد باید یک هفته قبل از عمل و دو الی چهار هفته بعد از عمل سرکلاژ از نزدیکی پرهیز نماید.



مراجعةه مجدد به پزشک

در صورت بروز هر یک از علائم زیر باید به پزشک معالج اطلاع داده شود.

بروز انقباض رحمی و درد زیرشکم و کمرمثل:

- دردهای زایمان
- خونریزی واژینال
- تب بالای ۳۸ درجه همراه بالرز
- تهوع و استفراغ
- ترشح زیاد واژینال
- پارگی کیسه آب



مراقبت‌های قبل و بعد عمل سرکلاژ



شام سبک

شب قبل از عمل بیمار یک شام سبک مثل سوپ مصرف نماید و پس از آن دیگر هیچ نوع مواد خوراکی و آشامیدنی مصرف نکند.



استراحت

بعد از انجام عمل سرکلاژ معمولاً چند ساعت دریخش تحت مراقبت قرار می‌گیرید و سپس مرخص می‌شود. باید چند روز در منزل استراحت کرده و از انجام کارهای سنگین خودداری نماید. انجام کارهای روزمره پس از اتمام دوره استراحت بلامانع است. از بلند کردن اجسام سنگین جلوگیری کنید.



نحوه عمل سرکلاژ

عمل سرکلاژ به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد. انتخاب روش عمل به شرایط بیمار و نظر پزشک معالج ارتباط دارد.

در عمل سرکلاژ با استفاده از نخ بخیه مخصوص، دهانه رحم بسته می‌شود.



سرکلاژ چیست؟

سرکلاژ یک نوع جراحی است که در موارد نارسایی دهانه رحم برای جلوگیری از باز شدن دهانه رحم و سقط انجام می‌گیرد.

در موارد نارسائی دهانه رحم، عمل سرکلاژ از سقط و زایمان زودرس جلوگیری می‌نماید.

نارسایی دهانه رحم به حالتی گفته می‌شود که بافت دهانه رحم توانایی تحمل وزن محصولات حاملگی را نداشته و در طول حاملگی بدون هیچ‌گونه علامتی (درد، انقباضات رحمی و ...) باز شده و باعث سقط می‌شود.

معمولًا سقط ناشی از نارسایی دهانه رحم در سه ماهه دوم بارداری رخ می‌دهد.